

新都区绿植养护方案

生成日期：2025-10-25

多肉植物与温度许多市面上贩卖的多肉植物都不耐寒。虽然有些龙舌兰和景天属多少能忍耐些轻微的霜降，却并不耐冻。我们一年四季给植物的最低温度是华氏55度（摄氏12度左右），一些敏感的品种则维持在华氏60度（摄氏十五度）以上。（一般来说零度以上，多肉植物都能抗住，5°以上为佳。）最高温度则取决于天气，大部分多肉都能很好地适应华氏100度（摄氏38度）的气温，长时间的高温顶多是让她们休眠而已。（高温闷湿的环境，往往不是休眠，而是安眠…一般来说35℃就抗得不轻松了）当然了，过高的温度还是会损伤植株，尤其是对于温室等全日照的养殖环境来说，良好的通风环境十分必要。高热且静止的空气会很快置多肉于死地。土培植物及时处理病落叶、并进行翻土。新都区绿植养护方案

简单来说，无土配方的基质是一些大小均匀的颗粒，以保证植物的健康生长，然后再以溶液或固体的方式添加养分。基质中科学地混合有腐熟的树皮（不是作景观用的树皮），园艺级的泥炭（不超过20%），珍珠岩（烘烤过的轻石），蛭石，以及用于调整土壤ph值的助剂。里面不含有任何园土或集料。评价基质好坏的两个重要标准是透水性和重量。传说中，好的多肉植物介质必须能够让所有水分迅速排干，不保水，以避免根腐。你当然可以照此选用干的特别快的介质预防烂根，但这样也预防了植物的正常生长，排水性过好的介质会让你的多肉长得像冰川移动那么慢。好的介质要保证一定的湿润度和营养，干的太快的达不到这样的标准。新都区绿植养护方案低矮类型品种不需要进行经常修剪。

黄苞竹芋是典型的肖竹芋属的观叶植物，偶尔也能开花，是极具观赏性的一种室内耐阴植物，可以将它养在灯光下，也能让它维持较好的状态。如果想要促进黄苞竹芋正常开花，那每天起码要保证有4~7小时的散射光，避免养在过度遮阴处。黄苞竹芋是依靠分株的方法来繁殖的，养护一段时间后，根茎底部会长新的侧枝，每隔一两年，就可以在春暖后换盆时，脱盆后就可以进行分株繁殖。养护黄苞竹芋盆栽要注意给予疏松排水好的盆栽土，如细椰糠、粗椰糠和珍珠岩，以5：3：2的比例混合，适当混入一些缓释肥，就能满足前期的生长。除了冬季，其他季节可以每隔2~3周补充一次薄肥，浓度不要太高，也不要给太多含有氮元素的肥料，否则会影响开花。黄苞竹芋害怕寒冷，冬季养护温度比较好是维持在10度以上，避免受冻。还要注意维持较高的湿度，相对湿度比较好是高于50%以上。

现代大尺度风景园林中，植物景观占有较大比重，一般性公园70%以上的陆地面积是绿化用地。因此，植物景观的空间布局结构对项目的成败起到至关重要的作用。构成植物景观的空间类型多样，尺度变化的范围也较大。在概念及详细规划阶段，以宏观尺度的空间疏密分布及其序列为植物景观空间规划的重点。空间疏密主要是指植物覆盖地表的程度，一般分为密林、疏林和疏林草地3类。随着现代风景园林规划尺度的增大，需求的功能越来越多，植物景观空间类型可进一步丰富、细化，以便更好地把控整个项目的植物景观基调。花序是花序轴及其着生在上方的花的通称，也可特指花在花轴上不同形式的序列。

植物养殖看似很简单，但其实不然，很多人都以为只要浇水就可以了。可不见几天，你心爱的花草就耷拉着脑袋。那是因为它们需要精心呵护，根据它们的生长特性给与足够的关怀。室内摆放盆栽植物就处于阴凉或略带阳光的位置，盆栽植物浇水过多，会使盆土湿涝并致使盆栽植物根部窒息而腐烂、叶黄又脱落。因此，室内盆栽植物的浇水应坚持“见干见湿，浇则浇透”的原则，切勿零星浇水或浇水过多。小技巧：用煮过蔬菜的水或是用洗过鱼的容器中的水来浇花，这样能会给植物营养，从而帮助它们生长。夏季气温高、湿度大，花木枝条中的形成层活动旺盛，是扦插繁殖花木的较好时机。新都区绿植养护方案

施肥的时候建议在阴雨天气施用。新都区绿植养护方案

排水对保持植物健康、正常生长具有重要作用。大量积水会增加土壤的缺氧程度，形成大量还原性物质，对植物根系造成严重损伤作用。灌水按照植物不同的生长阶段可分为冬水、生长水和保活水。冬水具有热容量较高、比热大的特点，减少植物冻害。受地温影响，冬水可以保证植系吸收足够的水分，推迟植物根系休眠期，减少枯梢，维护正常的蒸腾需求。冬水对土壤储备足够的水具有积极作用，减少翌年春天干旱对植物造成的伤害。生长水是夏季对植物进行的灌水。夏季是植物生长较为旺盛的阶段，由于夏季气温较高，植物蒸腾量较大，需要加强对植物的灌水。新都区绿植养护方案